"bottle"

Apollo® SC Acaricide Ovicide | GROUPE 10 INSECTICIDE

COMMERCIAL

ATTENTION **RINCER**

POISON **TROIS FOIS**

GARANTIE: clofentezine*, 500 grammes par litre
***3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine**
Contient du Benzisothiazolin-3-one-1,2 à raison de 0,0225% à titre d'agent de conservation.

NO D'HOMOLOGATION 21035 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE MODE D'EMPLOI CI-JOINT AVANT L'UTILISATION

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Éviter toute ingestion du produit. Éviter son contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tous les utilisateurs doivent se conformer aux précautions de manutention, au mode d'emploi et aux méthodes de nettoyage qui apparaissent sur l'étiquette. Porter un chapeau à large rebord, une combinaison à manches longues et un tablier (ou un costume de pluie non perméable) et des gants appropriés à l'épreuve des produits chimiques durant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage, afin de minimiser l'exposition au produit. Bien se laver les mains et la peau exposée avant de manger, boire ou fumer et après avoir pulvérisé ou manipulé le produit. Bien laver tous les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Pour protéger les poissons et la faune, ne jamais contaminer les lacs, rivière, cours d'eau et étangs avec l' Apollo® SC Acaricide Ovicide.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca.

PREMIERS SOINS:
En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalatio**n: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le contact du produit avec la peau ou les yeux peut causer une irritation. Le personnel médical doit communiquer avec le service d'informations médicales de Adama 1-855-264-6262

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

VOIR L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT QUI PORTE LES INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION, LE MODE D'EMPLOI ET DES PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES.

Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.
302 - 179 McDermot Avenue
Winnipeg, MB
R3B 0S1
855-264-6262

473 mL

Produit d'Allemagne

"full label"
APOLLO SC ACARICIDE OVICIDE

Une préparation à suspension concentrée (SC) pour la suppression d'acariens sur les pommes, les poires, les pêches, les nectarines, les framboises, fraises et le matériel de pépinière extérieure provenant de feuillus

COMMERCIAL | GROUPE | 10 | INSECTICIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NO D'HOMOLOGATION: 21035 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE: Clofentezine*, 500 grammes par litre
***3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine**.
Contient du Benzisothiazolin-3-one-1,2 à raison de 0,0225% à titre d'agent de conservation.

ATTENTION **RINCER**

POISON **TROIS FOIS**

Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.
302 - 179 McDermot Avenue
Winnipeg, MB
R3B 0S1
855-264-6262

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter toute ingestion du produit. Éviter contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Tous les utilisateurs doivent se conformer aux précautions de manutention, au mode d'emploi et aux méthodes de nettoyage qui apparaissent sur l'étiquette. Porter un chapeau à large rebord, une combinasion à manches longues et un tablier (ou un costume de pluie non perméable) et des gants appropriés à l'épreuve des produits chimiques durant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage, afin de minimiser l'exposition au produit. Bien se laver les mains et la peau exposée avant de manger, boire ou fumer et après avoir pulvérisé ou manipulé le produit. Bien laver tous les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Pour protéger les poissons et la faune, ne jamais contaminer les lacs, rivières, cours d'eau et étangs avec l' Apollo® SC Acaricide Ovicide.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le contact du produit avec la peau ou les yeux peut causer une irritation. Le personnel médical doit communiquer avec le service d'informations médicales de Adama Agricultural Solutions Canada Ltd. 1-855-264-6262.

ENTREPOSAGE: Conserver dans son contenant d'origine, hermétiquement fermé, dans un endroit sûr.

ÉLIMINATION

CONTENANTS RECYCLABLES : Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.

2. Rendre le contenant inutilisable. S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

ÉLIMINATION DES PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR : Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

POUR PLUS D'INFORMATION OU EN CAS D'INCENDIE, DE FUITE OU D'ENDOMMAGEMENT DE RECIPIENTS, SIGNALER IMMEDIATEMENT: 1-800-334-7577.

AVIS À L'UTILISATEUR
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

MODE D'EMPLOI
Renseignements généraux
L'Apollo® SC Acaricide Ovicide est un acaricide ou miticide spécifique qui exerce son action surtout comme ovicide mais qui a aussi un effet contre les jeunes insectes qui commencent à se déplacer. La durée de son activité résiduelle contre les tétranyques visés particulièrement lorsqu'il est appliqué entre la fin de dormance et la première couverture, dépend de l'âge des groupes de tétranyques traités, des espèces de tétranyques et des populations de prédateurs qui attaquent les tétranyques.

CAUTION: Les cultures ou endroits traités ne doivent pas être utilisés pour le pâturage ou comme fourrage; il n'y a pas assez de données disponibles à ce moment pour appuyer un tel usage.

NE PAS FAIRE PLUS D'UNE APPLICATION D'APOLLO SC ACARICIDE OVICIDE PAR SAISON.

Emploi sur les pommiers et poiriers
Espèces visées: Tétranyque rouge du pommier *Panonychus ulmi*, Tétranyque à deux points *Tetranychus urticae*, Tétranyque de McDaniel *Tetranychus mcdanieli*

Appliquer à l'aide d'un équipement terrestre en utilisant des arrosages dilués ou concentrés. Appliquer de 300 à 600 mL d' Apollo® SC Acaricide Ovicide par hectare. Lorsqu'on emploie un taux élevé de dilution (3800 litres d'eau ou plus), il faut utiliser au moins 75 mL d' Apollo® SC Acaricide Ovicide par 950 litres de bouillie de pulvérisation. Utiliser suffisamment d'eau pour couvrir complètement les arbres, mais jamais moins de 475 litres par hectare. Ne pas utiliser moins de 300 mL d' Apollo® SC Acaricide Ovicide par hectare dans les arrosages concentrés. L' Apollo® SC Acaricide Ovicide donne de meilleurs résultats lorsqu'on l'applique sur les oeufs ou sur les jeunes acariens qui commencent à se déplacer, mais il n'est pas efficace contre les adultes.

Pommiers
L' Apollo® SC Acaricide Ovicide peut être appliqué n'importe quand à partir de la fin de dormance jusqu'à la première couverture. En début de saison, on obtiendra les meilleurs résultats possibles si les traitements sont effectués au moment de la chute des pétales, avant l'éclosion des tétranyques. Ne pas appliquer après la première couverture (pourvu que la première couverture ne soit pas plus de 14 jours après la chute des pétales).

Poiriers
Apollo® SC Acaricide Ovicide peut être appliqué du début de la saison (après la fin de dormance) jusqu'à l'été. Appliquer dès les premiers signes de la présence d'acariens, lorsque les populations sont surtout composées d'oeufs et de quelques jeunes acariens mobiles (moins de 3 par feuille). Ne pas appliquer dans les 21 jours précédant la récolte.

NOTE:
Voici des facteurs qui pourraient inciter les utilisateurs à employer une dose supérieure à 300 mL d' Apollo® SC Acaricide Ovicide par hectare:
1. Applications plus tôt en saison pour les sections où il y a beaucoup d'oeufs de tétranyques rouges du pommier qui ont survécu à l'hiver.
2. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs qui attaquent les tétranyques.
3. Pour assurer un bon recouvrement d'arbres réguliers arrivés à leur pleine grandeur et/ou d'arbres qui sont très feuillus.

Emploi sur les pêches et les nectarines
Espèces visées:
Tétranyque à deux points *Tetranychus urticae*, Tétranyque rouge~~,~~ du pommier *Panonychus ulmi*

Pulvériser à l'aide d'équipement terrestre à air comprimé. Appliquer à raison de 300 mL d' Apollo® SC Acaricide Ovicide par hectare. Utiliser un volume d'eau suffisant pour obtenir une application uniforme mais pas moins de 475 litres par hectare. Apollo® SC Acaricide Ovicide peut être appliqué au début de la saison (stade de fin de dormance) et jusqu'à 14 jours après le stade du calice. Appliquer dès les premiers signes de présence des acariens, lorsque les populations présentes sont surtout au stade des oeufs et qu'on note peu de jeunes acariens mobiles. Ne pas appliquer dans les 21 jours précédant la récolte.

Emploi sur les framboises et les fraises
Espèce visée:
Tétranyque à deux points *Tetranychus urticae*

Appliquer au taux de 500 mL/ha aux premiers signes d'activité des tétranyques. Appliquer à l'aide d'un équipement terrestre en utilisant 500 à 1000 litres d'eau par hectare. Ne pas appliquer dans les 15 jours précédant la récolte.

MODE D'EMPLOI : Emploi sur le matériel de pépinière extérieure provenant de feuillus
Espèces visées :
Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) sur le matériel de pépinière provenant de feuillus (y compris *malus, pyrus, rosa, clematis, crataegus, hedera, potentilla, ribes, ulmus, caragana, euonymus, salix, prunus* et plantes vivaces herbacées)

Dose d'application :
On recommande une concentration de 80 mL d' APOLLO® SC ACARICIDE OVICIDE par hectare (40 g m.a./ha) dans 1 000 litres de bouillie.

Si une moindre quantité de solution par hectare est nécessaire pour traiter adéquatement la couverture végétale, il faut ajuster le volume de pulvérisation en conséquence en utilisant la même concentration de pulvérisation (rapport millilitres de produit/litres d'eau). Il ne faut pas dépasser la dose d'application de 80 mL produit/ha.

Ne pas faire plus d'une application d'APOLLO SC ACARICIDE OVICIDE par saison.

Méthode d'application :
Appliquer comme bouillie diluée au moyen d'un équipement pour le traitement terrestre.

Moment propice pour l'application :
APOLLO® SC ACARICIDE OVICIDE donne de meilleurs résultats lorsqu'il est appliqué sur les œufs ou les acariens aux stades mobiles. Il est inefficace contre les insectes adultes.

Il faut appliquer APOLLO® SC ACARICIDE OVICIDE dès les premiers signes d'activité des acariens ou lors de la ponte d'œufs. Appliquer lorsque les populations d'acariens sont principalement au stade de l'œuf, et qu'il y a peu d'acariens aux stades mobiles.

Ne pas entrer ou permettre aux travailleurs d'entrer dans les aires traitées dans les 12 heures suivant le traitement.

RECOMMENDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE DES ACARIENS
Gestion de la résistance, Apollo® SC Acaricide Ovicide, acaricide du groupe 10. Toute population d'acariens peut renfermer des individus naturellement résistants à Apollo® SC Acaricide Ovicide et à d'autres acaricides du groupe 10. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si ces acaricides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut existerd'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux acaricides :

•Makhteshim-Agan of North America Inc. recommande qu' Apollo® SC Acaricide Ovicide ne soit appliqué qu'une fois par année. Si d'autres traitements acaricides s'imposent au cours d'une saison, utiliser un acaricide qui affiche un mode d'action différent.

•Utiliser des mélanges en cuve contenant des acaricides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.

•Utiliser les acaricides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes delutte chimique.

•Inspecter les populations d’acariens traitées pour y découvrir les signesde l’acquisition d’une résistance.

•Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la Lutte intégrée.

•Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser à Adama Agricultural Solutions Canada au 1 855-264-6262.

Apollo est une marque déposée de Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.

****

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))